

## 31. Impf-Update

### Kontingentierung von BioNTech | Moderna unbegrenzt

Der Impfprozess stolpert leider weiter von einer Sondersituation in die nächste. Und wieder sind es die Praxen, die dies aushalten, umsetzen und an ihre Patienten kommunizieren müssen! Damit erleben wir zum wiederholten Male, dass die politische Spitze im BMG weder die organisatorische noch die emotionale Seite der Prozesse ausreichend antizipiert. Im Zusammenspiel mit geradezu dreisten Äußerungen einzelner selbstgefälliger Landespolitiker entsteht hier eine weitere Zumutung für diejenigen, die alles daransetzen, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Wir haben große Hochachtung vor allen, die um der größeren Sache willen diese Volten und Eskapaden noch schlucken und am gemeinsamen Ziel festhalten.

#### Die Fakten:

Ab nächster Woche können maximal 5 Vials Comirnaty pro Arzt geliefert werden. Dafür steht Spikevax der Fa. Moderna unbegrenzt zur Verfügung. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Bestellung für die kommende Woche. Ihr Rezept muss bis morgen Mittag in der Apotheke sein. Die kleine Menge Comirnaty soll bevorzugt für Impfungen bei Personen unter 30 Jahren sowie für Schwangere genutzt werden, auch dürfen Jugendliche von 12 – 17 nur mit BioNTech geimpft werden, da Moderna erst ab 18 Jahren zugelassen ist! Das verringerte Kontingent Comirnaty sollte insofern möglichst für die noch fehlenden Grundimmunisierungen dieser Altersgruppen reserviert werden.

Spikevax ist gemäß STIKO bzgl. der Covid-Wirkung gleichwertig zu Comirnaty. Allein für Menschen unter 30 ist das potentielle Risiko für Myo- und Pericarditiden leicht höher. Das 46. Epidemiologische Bulletin ist am Wochenende erschienen. Sie finden es auf der KVSH-Website unter [www.kvsh.de/corona/covid-impfungen](http://www.kvsh.de/corona/covid-impfungen) - STIKO.

#### Steckbrief zu Spikevax:

- keine Rekonstitution, Spikevax ist eine Fertigsuspension
- Jedes Vial enthält 5ml. Für eine Grundimmunisierung je Impfung 0,5 ml (=10 Personen), für die Boosterimpfung 0,25 ml (=20 Personen)
- Der Impfstoff kann analog zu BioNTech im Kühlschrank ungeöffnet 30 Tage gelagert werden
- Nicht schütteln!
- Ein geöffnetes Vial muss nach 19 Stunden verbraucht sein. Damit ist es möglich, auch am Nachmittag noch ein Vial zu öffnen und es am nächsten Morgen weiter zu nutzen.
- Engpässe bei den Etiketten für die Impfpässe sind möglich, da vorläufig nur 11 Etiketten zu einem Vial mitgeliefert werden.

## Kommunikation:

Bitte teilen Sie Ihren Patienten > 30 mit, dass

- im Moment nur Moderna zur Verfügung steht,
- dass dies ein qualitativ gleichwertiger und ebenso sicherer mRNA-Impfstoff wie BioNTech ist.
- dass die STIKO auch bei Vorimpfungen mit anderen Impfstoffen Moderna zur Boosterung empfiehlt
- dass es momentan am wichtigsten ist, so viele Menschen wie möglich zu impfen, um die Pandemie endlich in den Griff zu bekommen

## Mengen des BMG

- BioNTech: Aktuell sind 3 Millionen Dosen ausgeliefert und noch nicht verimpft. Bis zum Jahresende werden noch ca. 21 Millionen Dosen ausgeliefert.
- Spikevax: Aktuell sind 800.000 Dosen ausgeliefert und noch nicht verimpft. Bis zum Jahresende können noch ca. 26 Millionen Dosen ausgeliefert werden.

Impfzentren oder -stellen oder -teams werden nicht bevorzugt beliefert. Es gibt auch keine Landeslager mehr, jeder Impfstoff kommt per Apothekengroßhandel aus dem Bundeslager.

## Schnellinformation zu Impfschemata

Hier eine leicht verkürzte Form der Übersicht zur jetzt seitens der STIKO geratenen Impfstoffnutzung. Das Original befindet sich im 46. Epidemiologischen Bulletin vom 18.11.2021.

Alters-Gruppe	Grundimmunisierung			Auffrischungsimpfung	
	1. Dosis	2. Dosis	Impf-Abstand	3. Dosis	Abstand zur 2. Dosis i.R.
12 - 30	Comirnaty	Comirnaty	3 - 6 Wo	Comirnaty	6 Mon.
> 30	Spikevax 0,5 ml	Spikevax 0,5 ml	4 - 6 Wo	Spikevax 0,25 ml	6 Mon.
> 60	Vaxzevria	Comirnaty	ab 4 Wo	Comirnaty	6 Mon.
> 60	Vaxzevria	Spikevax 0,5 ml	ab 4 Wo	Spikevax 0,25 ml	6 Mon.
> 60	J&J	Comirnaty	ab 4 Wo	Comirnaty	6 Mon.
> 60	J&J	Spikevax 0,5 ml	ab 4 Wo	Spikevax 0,25 ml	6 Mon.
	Nicht-EU-Impfstoff: neue Grundimmunisierung				

Die STIKO ergänzt: Für die Auffrischungsimpfung soll möglichst der mRNA-Impfstoff verwendet werden, der bei der Grundimmunisierung zur Anwendung kam. **Wenn dieser nicht verfügbar ist, kann der jeweils andere mRNA-Impfstoff verwandt werden.** Dies trifft jetzt auf sehr viele Menschen zu, die ihre Grundimmunisierung mit Comirnaty erhalten haben.